



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde
DEVISA - Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Saúde

Campinas, 12 de novembro de 2018.

Orientação sobre o uso de Isoniazida comprimidos para crianças

O esquema básico de tratamento de tuberculose em crianças (< de 10 anos de idade) é composto por três fármacos na fase intensiva (Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida), e dois na fase de manutenção (Isoniazida e Rifampicina), sendo a apresentação da Isoniazida em comprimidos, e apresentações da Pirazinamida e Rifampicina em suspensão. A Isoniazida é também utilizada no tratamento da infecção latente por tuberculose (ILT), tanto em adultos como em crianças.

Dose de Isoniazida recomendada para tratamento da tuberculose e da infecção latente:

PESO	Dose
Até 20Kg	10 (7-15) mg/Kg/dia
≥ 21 Kg a 25 Kg	200 mg/dia
≥ 26 Kg	300 mg/dia

O comprimido de Isoniazida, para administração em crianças, deverá ser macerado e diluído em 10 ml de água filtrada ou destilada, compondo uma solução de 10mg/ml e a dose prescrita deverá ser administrada imediatamente. Deverá ser administrada em dose única diária. Realizar preferencialmente a medicação supervisionada.

Referência:

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

Responsáveis Técnicos:

Valéria Correia de Almeida- Médica Infectologista –DEVISA.

Salete Castelli Girardi- Farmacêutica- Departamento de Saúde.