



Tabela de orientação vigente no Brasil para vacinação de febre amarela para residentes em área com recomendação

Indicação	Esquema
Crianças de 9 meses até 4 a 11m 29d	1 Dose aos 9 meses e 1 reforço aos 4 anos de idade
Pessoas a partir de 5 anos de idade que receberam 1 dose de vacina antes de completar 5 anos.	1 Dose de reforço
Pessoas a partir de 5 anos de idade nunca vacinadas ou sem comprovação de vacinação	Administrar 1 dose de vacina e agendar reforço para 10 anos da data da primeira dose
Pessoas a partir de 5 anos de idade que receberam 2 doses da vacina	Considerar vacinado e não fazer outra dose
Pessoas com 60 anos ou mais de idade que nunca foram vacinados ou sem comprovação de vacinação	Médico deve avaliar risco/benefício da vacinação considerando risco da doença e risco de eventos adversos nesta faixa etária e/ou decorrentes de comorbidades
Gestantes, independente do estado vacinal	Vacina contraindicada. Em situações de emergência epidemiológica ou viagem para locais de risco de contrair a doença, o médico deverá avaliar risco/benefício da vacinação.
Mulheres amamentando crianças até 6 meses de idade, independente do estado vacinal	Vacina não está indicada. Adiar a vacinação. Em situações de emergência epidemiológica ou viagem para locais de risco de contrair a doença, o médico deverá avaliar risco/benefício da vacinação. Caso recebam a vacina após consentimento médico, o aleitamento materno deverá ser suspenso por 28 dias (mínimo 15 dias)
Viajantes	Para viagens internacionais: 01 dose de vacina é válida para toda a vida para emissão do CIVP (Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia), não sendo necessário reforço a cada 10 anos. Viagens dentro do Brasil para áreas com recomendação de vacinação de febre amarela: Vacinar de acordo com normas do PNI pelo menos 10 dias antes da viagem no caso de primovacinação.

Intervalo mínimo entre as doses: 30 dias