



PROTOCOLO PARA PRESCRIÇÃO DE OSELTAMIVIR 30 MG, 45 MG E 75 MG

07/Abril/2017

Com o objetivo de otimizar a dispensação do medicamento Oseltamivir para pacientes no município de Campinas, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas vem reafirmar a importância de que sejam observados os esquemas terapêuticos definidos pelo Ministério da Saúde:

- casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
- casos de Síndrome Gripal em pacientes que apresentam fatores de risco para complicação.

DROGA	FAIXA ETÁRIA	POSOLOGIA	
OSELTAMIVIR	Adulto	75 mg, vo*, 12/12h, 5 dias	
	Criança maior de 1 ano de idade	≤ 15 kg	30 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 15 kg a 23 kg	45 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 23 kg a 40 kg	60 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 40 kg	75 mg, vo, 12/12h, 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3 mg por kg, vo, 12/12h, 5 dias
9 a 11 meses		3,5 mg por kg, vo, 12/12h, 5 dias	
ZANAMIVIR	Adulto	10 mg: duas inalações de 5 mg, 12/12h, 5 dias	
	Criança	≥ 7 anos 10 mg: duas inalações de 5 mg, 12/12h, 5 dias	
Dose para Tratamento no Período Neonatal – Tratamento durante cinco dias			
Recém-nascido pré-termo	1 mg/kg/dose 12/12 horas até 38 semanas de idade		
Período Neonatal	1 mg/kg/dose 12/12 horas < 38 semanas de idade		
	1,5 mg/kg/dose 12/12 horas de 38 a 40 semanas de idade		
	3 mg/kg/dose de 12/12 horas em RN com IG > 40 semanas		

*Via oral - Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza, 2015
(http://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/RESP/pdf/INFLU15_PROTOCOLO_ATUALIZADO.pdf)



Prescrição

Considerando a variação da disponibilidade do medicamento Oseltamivir (30mg, 45mg e 75mg), e com a finalidade de evitar o deslocamento do paciente para a troca de prescrição de cápsula não disponível, solicitamos que os profissionais prescrevam considerando as 3 dosagens de cápsulas, em uma **única receita**. (OBS: Essa recomendação é especialmente importante, uma vez que, no caso de o profissional vir a realizar 3 receitas distintas, abre-se a possibilidade de haver a retirada do medicamento mais de uma vez). O objetivo é que a dose prescrita possa ser composta adequadamente a partir das distintas apresentações (dosagens) de cápsulas disponíveis no momento da dispensação.

Exemplo da prescrição sugerida:

Criança: 1 ano e 6 meses

Peso: 12kg

Dose recomendada: 30mg

Oseltamivir 75mg

Diluir o conteúdo da cápsula em 7,5 mL de água filtrada ou fervida fria com ajuda de uma seringa. Com a mesma seringa aspirar 3 mL da suspensão e administrar via oral para a criança. (1mL = 10mg).

Tomar de 12/12 horas por 5 dias

Ou

Oseltamivir 45mg

Diluir o conteúdo da cápsula em 4,5 mL de água filtrada ou fervida fria com ajuda de uma seringa. Com a mesma seringa aspirar 3 mL da suspensão e administrar via oral para a criança. (1mL = 10mg)

Tomar de 12/12 horas por 5 dias

Ou

Oseltamivir 30mg

Diluir o conteúdo da cápsula em 3,0 mL de água filtrada ou fervida com ajuda de uma seringa. Com a mesma seringa aspirar 3 mL da suspensão e administrar via oral para a criança. (1mL = 10mg)

Tomar de 12/12 horas por 5 dias

*Obs: Considerando o sabor amargo do medicamento, para melhorar sua aceitação por crianças, a água onde se dissolve a cápsula pode ser adoçada (com açúcar refinado ou mascavo).

Material a ser utilizado no momento da dispensação pela farmácia:
Anexos I, II e III.

Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Saúde



ANEXO I

ORIENTAÇÃO PARA O PREPARO DA SUSPENSÃO ORAL (Uso exclusivo da farmácia para dispensação)

OSELTAMIVIR 75 MG

1. Segurar uma cápsula de oseltamivir 75 mg sobre um copo, abrir a cápsula cuidadosamente e colocar o pó no fundo do copo;
2. Adicionar 7,5 mL de água ao pó, utilizando seringa graduada de 10 mL;
3. Mexer com uma colher durante cerca de 2 minutos;

Não é necessário retirar qualquer pó branco não dissolvido.

4. Aspirar para a seringa a quantidade correta do líquido. Dar ao paciente **imediatamente** após a preparação da suspensão.

POSOLOGIA INDICADA: _____ mg de ___/___ horas

SUSPENSÃO PREPARADA: 10 mg/ mL

USAR: _____ mL da preparação de ___/___ horas

Desprezar o restante da suspensão NÃO UTILIZADA na pia ou vaso sanitário sob fluxo abundante de água corrente. Repetir o processo cada vez que for dar o medicamento à criança.



ANEXO II

ORIENTAÇÃO PARA O PREPARO DA SUSPENSÃO ORAL (Uso exclusivo da farmácia para dispensação)

OSELTAMIVIR 45 MG

1. Segurar uma cápsula de oseltamivir 45 mg sobre um copo, abrir a cápsula cuidadosamente e colocar o pó no fundo do copo;
2. Adicionar 4,5 mL de água ao pó, utilizando seringa graduada de 5 mL;
3. Mexer com uma colher durante cerca de 2 minutos;

Não é necessário retirar qualquer pó branco não dissolvido.

4. Aspirar para a seringa a quantidade correta do líquido. Dar ao paciente **imediatamente** após a preparação da suspensão.

POSOLOGIA INDICADA: _____ mg de ___/___ horas

SUSPENSÃO PREPARADA: 10 mg/ mL

USAR: _____ mL da preparação de ___/___ horas

Desprezar o restante da suspensão NÃO UTILIZADA na pia ou vaso sanitário sob fluxo abundante de água corrente. Repetir o processo cada vez que for dar o medicamento à criança.



ANEXO III

ORIENTAÇÃO PARA O PREPARO DA SUSPENSÃO ORAL (Uso exclusivo da farmácia para dispensação)

OSELTAMIVIR 30 MG

1. Segurar uma cápsula de oseltamivir 30 mg sobre um copo, abrir a cápsula cuidadosamente e colocar o pó no fundo do copo;
2. Adicionar 3 mL de água ao pó, utilizando seringa graduada de 5 mL;
3. Mexer com uma colher durante cerca de 2 minutos;

Não é necessário retirar qualquer pó branco não dissolvido.

4. Aspirar para a seringa a quantidade correta do líquido. Dar ao paciente **imediatamente** após a preparação da suspensão.

POSOLOGIA INDICADA: _____ mg de ___/___ horas

SUSPENSÃO PREPARADA: 10 mg/ mL

USAR: _____ mL da preparação de ___/___ horas

Desprezar o restante da suspensão NÃO UTILIZADA na pia ou vaso sanitário sob fluxo abundante de água corrente. Repetir o processo cada vez que for dar o medicamento à criança.