

HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI

SERVIÇO DE UROLOGIA

SETOR DE URODINAMICA

INDICAÇÕES DO ESTUDO URODINÂMICO

CRIANÇAS

- Espinha bífida – inicial e seguimento
- Disrafismos ocultos, medula presa e tumores espinais
- Malformações urológicas: válvula de uretra posterior, epispádia, extrofia de bexiga, extrofia de cloaca, estenoses de uretra, Síndrome Prune-Belly
- Trauma medular, de uretra e de esfíncter
- Enurese noturna complicada
 - Não responsiva às medidas convencionais
 - Hidronefrose
 - ITU de repetição
- Incontinência urinária diurna, incontinência de urgência, bexiga preguiçosa e ITU de repetição, associadas ou não à constipação intestinal (Síndrome da eliminação disfuncional), Síndrome de Hinman

HOMENS

- Queixas miccionais em idade não habitual de HPB
- Na ausência de aumento prostático pelas propedêuticas habituais que justifiquem os sintomas
- ITU de repetição
- Bexiga neurogênica
- Presença concomitante de qualquer outra causa potencial de disfunção miccional – doenças neurológicas, iatrogênicas e idade avançada
- Falha de tratamento cirúrgico
- Recuperações prostáticas
- Incontinência urinária de causa neurogênica ou não

MULHERES

- ITU de repetição
- Bexiga neurogênica
- Incontinência urinária de causa neurogênica
- Incontinência Urinária Mista
- Incontinência Urinária de Esforço
- Incontinência não demonstrada clinicamente
- Quando testes diagnósticos simples não foram conclusivos
- Indicação cirúrgica
- Fracasso cirúrgico e recidivas
- Falha do tratamento clínico

ANTES DA MARCAÇÃO DO ESTUDO O PACIENTE DEVERÁ TER

1. Urina l e urocultura sem a presença de infecção urinária com no máximo 30 dias.
2. Todos os paciente neurogênicos deverão ter Uretrocistografia miccional retrógrada.
3. O paciente deverá receber as orientações impressas.

OS EXAMES SERÃO REALIZADOS ÀS TERÇAS-FEIRAS NO HOSPITAL DR. MARIO GATTI