



## **INFORME TÉCNICO**

### **Fluxos e locais de dispensação do Oseltamivir**

*13/Abril/2016*

Com o objetivo de aprimorar as estratégias de dispensação do medicamento Oseltamivir para pacientes no município de Campinas, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas vem por meio deste informar a lista atualizada com os locais de distribuição do medicamento.

Para os pacientes com síndrome gripal, desde que apresentem critérios de indicação do tratamento com Oseltamivir, a retirada do medicamento deverá ser realizada, preferencialmente, na Unidade Básica de Saúde mais próxima dentre as apontadas na tabela abaixo:

#### ***Unidades Básicas de Saúde para dispensação***

<b>Distrito Norte</b>	<b>Distrito Leste</b>	<b>Distrito Noroeste</b>	<b>Distrito Sudoeste</b>	<b>Distrito Sul</b>
<b>CS Anchieta</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h às 19h.	<b>CS Quirino</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h às 21h. SÁBADO: 07h às 13h	<b>CS Ipaussurama</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 08h às 19h.	<b>CS Santa Lúcia</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h30 às 19h. SÁBADO: 07h30 às 13h	<b>CS Vila Ipê</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h às 22h. SÁBADO: 07h às 19h
<b>CS Barão Geraldo</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 08h às 19h.	<b>CS Costa e Silva</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 08h às 19h.	<b>CS Integração</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h30 às 20h30.	<b>CS Vista Alegre</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h às 17h. SÁBADO: 07h às 13h	<b>CS São José</b> Horário de funcionamento: SEG - SEXTA : 07h às 19h. SÁBADO: 07h às 12h



**Outros locais de dispensação**

<b>Farmácia do Pronto Socorro do Hospital Mário Gatti</b>	Endereço: Av. Prof. Faria Lima, 340 Horário de funcionamento: 24h
<b>Farmácia do Complexo Hospitalar Ouro Verde</b>	Endereço: Avenida Ruy Rodrigues, 3434 - Jardim Yeda Horário de funcionamento: 24h
<b>Farmácia Popular - Guanabara</b>	Endereço: Rua Clóvis Bevilacqua, 535, Bairro Guanabara Horário de funcionamento: SEG à SEXTA:8h às 18h e SÁBADO: 8h às 12h
<b>Farmácia Popular - Centro</b>	Endereço: Rua Dr. Quirino, nº 567, Centro Horário de funcionamento: SEG à SEXTA:8h às 18h e SÁBADO: 8h às 12h
<b>PA Campo Grande</b>	Endereço: Rua Dirce de Oliveira Santos, nº 280 - Jd. Alto Belém Horário de funcionamento: 24h

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a dispensação continuará a se dar por meio da solicitação do serviço de saúde ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde e, obrigatoriamente, deve ser formalizada por meio do envio de prescrição médica e da notificação do caso (com Ficha de Investigação Epidemiológica devidamente preenchida).

Importante ressaltar que vem sendo observado um crescente número de prescrições médicas indicando o Oseltamivir para pacientes que não preenchem nenhum dos critérios de indicação de tratamento. Frente a esse fato, ratificamos que o uso terapêutico do Oseltamivir é recomendado e se justifica apenas nas seguintes situações:

- casos de **Síndrome Respiratória Aguda Grave**
- casos de **Síndrome Gripal em pacientes que apresentam fatores de risco para complicação** (Tabela 1).



Tabela 1 – Condições ou fatores de risco para complicação

- Grávidas em qualquer idade gestacional;
- Puérperas até duas semanas após o parto;
- Adultos  $\geq$  60 anos;
- Crianças  $<$  5 anos;
- População indígena aldeada;
- Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye);
- Indivíduos que apresentem:
  - ✓ Pneumopatias (incluindo asma);
  - ✓ Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e possibilidade de reativação);
  - ✓ Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);
  - ✓ Nefropatias;
  - ✓ Hepatopatias;
  - ✓ Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
  - ✓ Distúrbios metabólicos (incluindo *diabetes mellitus*);
  - ✓ Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico - AVE ou doenças neuromusculares);
  - ✓ Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids ou outros;
  - ✓ Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC  $\geq$  40 em adultos).

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza, 2015  
([ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc\\_tec/RESP/pdf/INFLU15\\_PROTOCOLO\\_ATUALIZADO.pdf](ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/RESP/pdf/INFLU15_PROTOCOLO_ATUALIZADO.pdf), acessado em 30/03/2016)

Ressalte-se, também, que em tais situações, quando houver indicação do uso do antiviral, seu início deve ser o mais precoce possível, sobretudo nas primeiras 48 horas, e deve seguir as posologias estabelecidas (*Tabela 2*). Após esse período, se descreve uma significativa da eficácia do tratamento.



DROGA	FAIXA ETÁRIA	POSOLOGIA	
OSELTAMIVIR	Adulto	75 mg, vo*, 12/12h, 5 dias	
	Criança maior de 1 ano de idade	≤ 15 kg	30 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 15 kg a 23 kg	45 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 23 kg a 40 kg	60 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 40 kg	75 mg, vo, 12/12h, 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3 mg por kg, vo, 12/12h, 5 dias
9 a 11 meses		3,5 mg por kg, vo, 12/12h, 5 dias	
ZANAMIVIR	Adulto	10 mg: duas inalações de 5 mg, 12/12h, 5 dias	
	Criança	≥ 7 anos 10 mg: duas inalações de 5 mg, 12/12h, 5 dias	
<b>Dose para Tratamento no Período Neonatal – Tratamento durante cinco dias</b>			
Recém-nascido pré-termo	1 mg/kg/dose 12/12 horas até 38 semanas de idade		
Período Neonatal	1 mg/kg/dose 12/12 horas < 38 semanas de idade		
	1,5 mg/kg/dose 12/12 horas de 38 a 40 semanas de idade		
	3 mg/kg/dose de 12/12 horas em RN com IG > 40 semanas		

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza, 2015  
([ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc\\_tec/RESP/pdf/INFLU15\\_PROTOCOLO\\_ATUALIZADO.pdf](ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/RESP/pdf/INFLU15_PROTOCOLO_ATUALIZADO.pdf), acessado em 30/03/2016)

Deve ser mencionado que o uso indiscriminado do Oseltamivir contribui para o incremento do risco de seleção de cepas resistentes do vírus ao antiviral além de expor, desnecessariamente, o paciente a possíveis eventos adversos relacionados à droga sem que existam os benefícios desejados.

---

**Departamento de Vigilância em Saúde**  
**Departamento de Saúde**