



## **INFORME TÉCNICO**

### **Fluxos e locais de dispensação do Oseltamivir**

***Abril/2017***

O Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas vem informar que o medicamento **Oseltamivir** em suas apresentações de **comprimidos de 30mg, 45mg e 75mg** está sendo dispensado em todas as Unidades Básicas de Saúde para os pacientes com Síndrome Gripal que apresentem critérios de indicação do tratamento (*Ver tabela abaixo*). Ressalte-se que a dispensação nas Unidades Básicas de Saúde se dará durante o horário de funcionamento habitual.

Na eventualidade de necessidade de aquisição do **Oseltamivir** para tratamento ambulatorial em períodos noturnos, finais de semana e feriados, a dispensação estará sendo realizada nos seguintes serviços:

<b>Farmácia do Pronto Socorro do Hospital Mário Gatti</b>	<b>Endereço:</b> Avenida Pref. Faria Lima, 340 - Parque Itália <b>Horário de funcionamento:</b> 24 horas
<b>Farmácia do Complexo Hospitalar Ouro Verde</b>	<b>Endereço:</b> Avenida Ruy Rodrigues, 3434 - Jardim Yeda <b>Horário de funcionamento:</b> 24 horas

Nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a dispensação continuará a se dar por meio da solicitação do serviço de saúde ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde e, obrigatoriamente, deve ser formalizada por meio do envio de prescrição médica e da notificação do caso (com Ficha de Investigação Epidemiológica devidamente preenchida).



### Grupos de pacientes com indicação de tratamento de Síndrome Gripal

- Grávidas em qualquer idade gestacional;
- Puérperas até duas semanas após o parto;
- Adultos  $\geq$  60 anos;
- Crianças < 5 anos;
- População indígena aldeada;
- Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye);
- Indivíduos que apresentem:
  - ✓ Pneumopatias (incluindo asma);
  - ✓ Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e possibilidade de reativação);
  - ✓ Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);
  - ✓ Nefropatias;
  - ✓ Hepatopatias;
  - ✓ Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
  - ✓ Distúrbios metabólicos (incluindo *diabetes mellitus*);
  - ✓ Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico - AVE ou doenças neuromusculares);
  - ✓ Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids ou outros;
  - ✓ Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC  $\geq$  40 em adultos).

### Esquemas posológicos para tratamento de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave

DROGA	FAIXA ETÁRIA	POSOLOGIA	
OSELTAMIVIR	Adulto	75 mg, vo <sup>+</sup> , 12/12h, 5 dias	
		$\leq$ 15 kg	30 mg, vo, 12/12h, 5 dias
	Criança maior de 1 ano de idade	> 15 kg a 23 kg	45 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 23 kg a 40 kg	60 mg, vo, 12/12h, 5 dias
		> 40 kg	75 mg, vo, 12/12h, 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3 mg por kg, vo, 12/12h, 5 dias
9 a 11 meses		3,5 mg por kg, vo, 12/12h, 5 dias	
ZANAMIVIR	Adulto	10 mg: duas inalações de 5 mg, 12/12h, 5 dias	
	Criança	$\geq$ 7 anos	10 mg: duas inalações de 5 mg, 12/12h, 5 dias
<b>Dose para Tratamento no Período Neonatal – Tratamento durante cinco dias</b>			
Recém-nascido pré-termo	1 mg/kg/dose 12/12 horas até 38 semanas de idade		
Período Neonatal	1 mg/kg/dose 12/12 horas < 38 semanas de idade		
	1,5 mg/kg/dose 12/12 horas de 38 a 40 semanas de idade		
	3 mg/kg/dose de 12/12 horas em RN com IG > 40 semanas		

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza, 2015

[ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc\\_tec/RESP/pdf/INFLU15\\_PROTOCOLO\\_ATUALIZADO.pdf](ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/RESP/pdf/INFLU15_PROTOCOLO_ATUALIZADO.pdf), acessado em 30/03/2017