

## Informe Salmonela newport de janeiro 2006

### Salmonela newport

A ViSA Leste recebeu uma notificação tardia em janeiro de 2006 de 1 caso confirmado de *S. newport* do laboratório Voza após a identificação do IAL. A paciente, E.A.S.C., 37 anos, fem, moradora da área de abrangência do CS Aurélia, teve início de sintomas dia 05/11/05 com febre, cólicas, diarreia líquida sem sangue, 1 episódio de vômito, dores no corpo. Procurou Pronto Socorro privado por 2 vezes, e no 3º atendimento o médico fez HD de Infecção Intestinal, indicou coprocultura e prescreveu o antibiótico se não houvesse melhora. Os sintomas tiveram duração aproximada de 14 dias que não cederam a sintomáticos e medidas iniciais de rehidratação, fez antibioticoterapia com Bactrim por 14 dias.

Como antecedentes alimentares referiu, salgadinhos a base de carne moída, queijo além de maionese, de um restaurante chinês consumiu yakisoba. Nem a família ou conhecidos que consumiram da mesma alimentação referiram os mesmos sintomas.

A *Salmonela newport* tem sido a 3ª.causa mais freqüente de surtos por salmonelas nos EUA, com o agravante de apresentar resistência a mais de 9 antibióticos. Têm sido causados por consumo de carnes e derivados contaminados. A contaminação cruzada, assim como a água contaminada por esta bactéria também têm causado estas infecções. No Estado de São Paulo, o CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica tem sido notificado casos isolados. A recomendação e os cuidados são os mesmos para todas as salmonelas, e como monitoramento, o IAL – Instituto Adolfo Lutz faz antibiograma para 4 antibióticos a saber: Ampicilina, Ciprofloxacina, Sulfametoxazol e Trimetropim. Neste caso desta paciente, revelou sensível para os 4 antibióticos.

Naoko Silveira – médica sanitária - CoViSA