

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Coordenadoria de Vigilância em Saúde**

Avenida Anchieta, 200 – 11º andar – Centro – CEP: 13015-904 – Tel. (19) 2116-0187 / 0286  
E-mail: [covisa@campinas.sp.gov.br](mailto:covisa@campinas.sp.gov.br)

Recomendações para tratamento de infecções  
bacterianas na rede básica da Secretaria de Saúde  
de Campinas

Campinas 20 de julho de 2009

# Antibioticoterapia ambulatorial para pneumonia em ADULTOS

- **Pneumonia em adulto SEM fatores de risco:**
  - **Amoxicilina** : 500 mg, VO, 8/8 horas—7 a 10 dias
  - ou
  - **Azitromicina**: 500 mg, VO, 1x/dia—3 a 5 dias
- **Pneumonia em adultos COM fatores de risco (co-morbidades estáveis):**
  - **Amoxicilina** (1 g, VO, 8/8 horas- 7 a 10 dias) **associada a** **Azitromicina** (500 mg, VO, 1x/dia- 5 a 7 dias)

## **Antibioticoterapia ambulatorial para pneumonia em ADULTOS**

- **Amoxicilina/ clavulanato: 500 a 1 g VO 8/8 horas - 7 a 10 dias**
  - Alternativa apenas em situações especiais
  - Liberação vinculada a utilização de impresso específico e relatório médico pormenorizado que justifique sua prescrição
  - Complementação ambulatorial de tratamentos iniciados em âmbito hospitalar

# Antibioticoterapia ambulatorial para pneumonia em ADULTOS

Necessidade de uso de drogas por via parenteral:

- Primeira escolha (sob observação na UBS ou PA):  
**Penicilina cristalina** - 3.000.000 U, IV, 4/4 horas (quando possível a substituição por droga de uso oral, completar o período total de 7-10 dias).
- **Ceftriaxone** (2g, EV ou IM, 24/24h) uso restrito e criterioso para pacientes que tenham critério de internação até encaminhamento ao serviço hospitalar de referência.

# Antibioticoterapia ambulatorial para pneumonia em CRIANÇAS

## Via oral:

- **Amoxicilina:** 50 mg/kg/dia (divididos 8/8h) em pacientes sem doenças de base
- **Amoxicilina:** 80mg/kg/dia (dividido 8/8h) em pacientes com doenças de base (pneumopatias crônicas, asma, hemoglobinopatias, neoplasias, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, cardiopatia congênita, indivíduos imunodeprimidos)
- **Eritromicina:** 40mg/kg/dia, VO (divididos 6/6h)
- **Azitromicina:** 500mg(1cp)/dia, VO. Pode ser usada para crianças acima de 45 kg.

# Antibioticoterapia ambulatorial para pneumonia em CRIANÇAS

## Via parenteral

*Indicações:* crianças com incapacidade de ingestão dos antibióticos ou casos mais severos

- **Penicilina procaína:** 50mg/kg/dia, IM (dividido 12/12h)
- Crianças menores de 2 meses:
  - **Ampicilina associada a Amicacina** ou Gentamicina
- Crianças maiores de 2 meses:
  - **Penicilina Cristalina:** 50 a 250.000UI/kg/dia, EV (dividido 4/4h)
  - **Ampicilina:** 200mg/kg/dia, EV ou IM (dividido 6/6h)
- Crianças maiores de 2 meses com evolução desfavorável:
  - **Oxacilina** (100- 200mg/kg/d, EV) **associada a Ceftriaxone** (50 – 100mg/kg/d, EV ou IM)