



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE AMBIENTAL
Av Anchieta, 200 Centro Campinas SP CEP 13015-904 fone:3735-0187 fone/fax:3735-0186
e-mail covisa.ve@campinas.sp.gov.br

INFORME HANSENÍASE - CAMPINAS
julho de 2005

Apesar de todos os esforços e da existência de tratamento específico facilitado e gratuito desde os anos 80 (poliquimioterapia), a hanseníase tem desafiado o Sistema Único de Saúde. O Brasil assinou em 1991 na 44ª Conferência Mundial de Saúde um compromisso de reduzir o coeficiente de prevalência de hanseníase para menos de 1 para cada 10.000 hab. no ano 2000, este número não foi alcançado. No final do ano de 2004 a prevalência no Brasil ficou em 1,6 por 10.000 hab, colocando o Brasil entre os países de maior prevalência e de maior número de casos de todo o mundo. Os números de prevalência no estado de São Paulo (1,23) e no município de Campinas (0,8) são um pouco melhores, mas temos muito a fazer (tabela 1 e gráfico1). Nos últimos anos a secretaria municipal de saúde tem desenvolvido diversas atividades no sentido de divulgar a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado para evitar seqüelas desta doença.

O tratamento da Hanseníase padrão em todo Brasil, inclusive São Paulo é: para pacientes multibacilares **12 doses de poliquimioterapia** tomadas em até 18 meses e para pacientes paucibacilares **6 doses de Poliquimioterapia** tomadas em até 9 meses. Esperamos que haja uma atenção especial para o seguimento de cada um dos pacientes, com busca ativa de comunicantes domiciliares e criação de vínculos com os serviços para evitar abandonos. É fundamental o diagnóstico precoce para evitar incapacidades. A secretaria de Saúde Municipal dispõe de unidades de referências nos casos de necessidade de encaminhamento para qualquer dúvida entre em contato coma Coordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental (COVISA, Fone: 3735-0233).

Gostaríamos de chamar a atenção para alguns **aspectos desta doença que deve estar na cabeça de todos profissionais de saúde a todo o momento:**

- **Qualquer mancha na pele pode ser Hanseníase**, portanto deve ser adequadamente examinada com teste de **sensibilidade**.
- Todos contatos domiciliares deverão ser examinados e submetidos à **segunda dose de BCG** (ou duas doses caso não tenham cicatriz deltóidea)
- **Uma das principais fontes de contaminação são os contatos domiciliares** que podem **incubar o bacilo por até 10 anos** e deverão ser considerados pacientes de risco até este período.
- A **avaliação neurológica inicial completa é fundamental** para que o paciente possa ser submetido a atendimento fisioterápico e evitar seqüelas.
- As Reações Hansênicas (ou Estados Reacionais) podem ocorrer em até 20% dos casos durante o tratamento e até 10% dos casos após o tratamento e deverão ser consideradas urgências uma vez que podem deixar seqüelas graves.
- Estamos particularmente preocupados com o pequeno número de casos diagnosticado no ano de 2005 até junho (14 casos), projetando para o ano 28 casos (tabela 1). A média anual de casos em Campinas tem sido de 89,4 nos últimos 10 anos com desvio padrão de 15,01. **A tendência de diminuir o número de casos não explica estes números e podemos estar diante de uma grande falha no diagnóstico destes pacientes.**

André R R Freitas
Médico sanitarista da SMS/CoViSA

Indicadores de Campinas

	Nº de casos	Prev./10.000	Nº de casos	Detec/10.000	Incapacidade >=2º grau	Detec 0-15a /10.000
1982			65	0,93		
1983			74	1,04		
1984			56	0,77		
1985			72	0,96		
1986			80	1,05		
1987			51	0,65		
1988			80	1,00		
1989			78	0,96		
1990			88	1,06		
1991			99	1,17		
1992			*			
1993			*			
1994			*			
1995	109	1,20	87	0,96	10,4%	0,19
1996	164	1,80	104	1,14	12,4%	0,09
1997	160	1,73	82	0,89	7,6%	0,21
1998	156	1,66	95	1,01	7,4%	0,25
1999	159	1,67	107	1,13	4,0%	0,21
2000	149	1,54	100	1,03	11,1%	0,09
2001	134	1,36	98	1,00	9,0%	0,21
2002	129	1,30	90	0,90	4,7%	0,08
2003	115	1,14	72	0,72	6,9%	0,00
2004	82	0,80	59	0,58	10,6%	0,00
2005	83	0,79	28**	0,27	10,0%	0,04

Fontes: até 1991 dados de arquivo manual (COVISA) após 1994 SINANW.

* - Dados indisponíveis

** - Projeção anual (dados até jun 2005).

Formatação do indicador:



Tabela – 1




Gráfico - 1